

INMOVILIZACIÓN DE CERVICALES


¿QUÉ ES?

La inmovilización es utilizada para inmovilizar y estabilizar a un paciente después de sufrir un accidente en donde se requiera estabilizar la columna vertebral y de esta forma prevenir la lesión de la médula espinal.

PROCEDIMIENTO

PASO 1

El brigadista "1" coloca la columna cervical en posición neutra (implica que la columna esté perfectamente alineada de manera natural al piso, la espalda conserva sus curvas, es decir, la curvatura cervical, lumbar hacia el frente y la curvatura en la zona torácica hacia atrás) desde la cabeza del paciente; presentamos el collarín.




PASO 2

El brigadista "2" ajusta el tamaño del collarín midiendo con una mano la distancia entre la línea inferior de la mandíbula y el trapecio (músculo que se encuentra en la espalda superior cerca del hombro) del paciente, y trasladando la misma al collarín.

PASO 3

Desde uno de los costados del paciente, el brigadista "2" desliza la lengüeta más larga del collarín por debajo de las manos del brigadista "1" que es el que se encuentra inmovilizando y por debajo del cuello del paciente.



PASO 4

El brigadista "2" ajusta la parte delantera del collarín y la fija con el velcro de la lengüeta que hemos pasado por debajo del cuello del paciente. Asegurándose que esté bien centrado. Y fijo.

NOTA: NO SE DEBE MOVER A UN ACCIDENTADO SIN ANTES HABER REALIZADO ESTA INMOVILIZACIÓN